

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ПОСЛЕ ПРОКОЛА МОЧЕК УШЕЙ СИСТЕМОЙ-75 (ПИСТОЛЕТОМ STUDEX)

Сегодня Вам прокололи ушки, но чтобы это событие было приятным в Ваших воспоминаниях, очень важно, чтобы процесс заживления прошел быстро и без проблем. Просим Вас строго соблюдать все рекомендации по уходу в местах прокола.

ВАЖНО! Спиртодержащих растворов при обработке мест прокола следует избегать – может возникнуть ожог тканей.

1. В течение 3-х дней **не мочить** место прокола.

2. **Ежедневно**, утром и вечером, в течение 2-х недель **обрабатывать** место прокола **гелем или лосьоном Studex** [либо раствором Мирамистина или Хлоргексидина биглюконатом]. Средство нужно наносить так, чтобы оно попадало на **точки входа и выхода иглы, а также в канал**. Во время обработки необходимо **прокручивать серьги** и двигать её в канале, но не снимать!

3. **Не посещать бассейн** в течении 2-х недель и не купаться в открытых водоемах в течение месяца.

4. Серьги **не снимать 4-6 недель** с момента прокола ушей!

5. Первую неделю заплывать волосы на ночь, не носить шапку с крупной вязкой и одежду с тугим воротом.

6. **При покраснении и болезненности** от прикосновения обрабатываем Мирамистином с добавлением мази «Белантен» 2 раза в день на протяжении 4-5 дней. При появлении гноя добавляем мазь «Левомеколь» или «Банеоцин» 2 раза в день на протяжении 5 – 7 дней. Либо Синтомицин.


Через 5-6 недель можно снять серьги-иглы и поменять их на другие украшения. В первый раз застежка снимается с определенным усилием. Делайте это **без спешки и обязательно чистыми руками**. Перед тем, как вставить новые серьги, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** обработайте их спиртом.

ТАКЖЕ ВАЖНО:


- Обязательно обрабатывайте ранку после принятия душа, ванны, бани, спортивных занятий и купаний в открытых водоемах и бассейнах.
- Во время проведения процедуры руки обязательно должны быть чистыми.
- Левомеколь не нужна и не надо мазать ею уши просто так, если они не гноятся, т. к. данная мазь предназначена для ведения гнойных ран и для ускорения процесса грануляции. Применение без надобности может вызвать разрастание рубцовой ткани. Гной, если в ранке разрослась инфекция, появляется на 4-6 день. Никак не ранее. То, что часто путают с гноем, всего лишь сукровица, либо сальное кожное отделяемое - нормальное выделение после травмы и во время заживления тканей.
- Застежки очень плотно вставляются в паз на игле сережки. Для того, чтобы снять надо очень хорошо зажать застежку и потянуть её в противоположную сторону от гвоздика (тянем в разные стороны).
- Антисептик нужно наносить в места прокола (спереди и сзади под серьги) и двигать их, чтобы средство попадало внутрь канала.



Серьги не должны «зажимать» мочку, они должны свободно двигаться, чтобы не закупоривались места проколов.



Во время обработки необходимо прокручивать серьгу и двигать её в канале, но не снимать!



Средство нужно наносить так, чтобы оно попадало на **точки входа и выхода иглы, а также в канал**.